


FIG. 2


Étapes d'opérationnalisation de la prise en charge des jeunes nourrissons malades atteints de possibilité d'infection bactérienne grave (PSBI) dans les centres de santé de premier niveau si la référence est impossible



* Un traitement antibiotique simplifié chez les jeunes nourrissons atteints de PSBI est recommandé dans les districts ou les zones où la référence est impossible pour quelque raison que ce soit: les hôpitaux de référence ne sont pas disponibles ou les familles n'acceptent pas la référence. Les raisons de la non-acceptation peuvent inclure le manque de moyens de transport, le coût des soins, les croyances culturelles ou de perception et la qualité des soins au niveau de l'hôpital de référence. Les services existants peuvent inclure la PCIMNE, les soins communautaires au nouveau-né, les programmes d'amélioration de la qualité des soins, etc.

FIG. 2

Étapes d'opérationnalisation de la prise en charge des jeunes nourrissons malades atteints de possibilité d'infection bactérienne grave (PSBI) dans les centres de santé de premier niveau si la référence est impossible



* Un traitement antibiotique simplifié chez les jeunes nourrissons atteints de PSBI est recommandé dans les districts ou les zones où la référence est impossible pour quelque raison que ce soit: les hôpitaux de référence ne sont pas disponibles ou les familles n'acceptent pas la référence. Les raisons de la non-acceptation peuvent inclure le manque de moyens de transport, le coût des soins, les croyances culturelles ou de perception et la qualité des soins au niveau de l'hôpital de référence. Les services existants peuvent inclure la PCIMNE, les soins communautaires au nouveau-né, les programmes d'amélioration de la qualité des soins, etc.